

Link do produktu: <https://mrsflower.pl/vetfood-proamyl-100g-odzywka-bialkowa-z-enzymami-dla-psa-i-kota-p-561.html>



Vetfood Proamyl 100g odżywka białkowa z enzymami dla psa i kota

Cena	62,00 zł
Kod EAN	5907368817613

Opis produktu

VetFood Proamyl saszetka 100g

Proamyl to odżywka białkowa dla zwierząt, będąca źródłem wysokiej jakości hydrolizowanego białka drobiowego (88% pełnowartościowego białka), enzymów trzustkowych, kwasów tłuszczowych Omega-3, inuliny – prebiotyku oraz beta-glukanu. Produkt jest przeznaczony do odżywiania zwierząt wychudzonych i wyniszczonych.

Przeznaczenie:

- odżywienie zwierząt wychudzonych i wyniszczonych,
- wspomagająco przy hipoalbuminemii,
- w okresie rekonwalescencji,
- uzupełnienie diety zwierząt z zespołem złego wchłaniania,
- uzupełnienie diety zwierząt z alergią i nietolerancją pokarmową.

Hydrolizat białkowy zawarty w produkcie dostarcza wysoce przyswajalny komplet aminokwasów, które wspomagają wzrost masy mięśniowej oraz regenerację całego organizmu. Zawartość enzymów trawiennych: proteazy, lipazy i amylazy ułatwia trawienie i wchłanianie trzech składników odżywczych (białek, tłuszczów oraz węglowodanów), co umożliwia znacznie lepsze wykorzystywanie zawartych w diecie składników biologicznie aktywnych przez organizm. Dodatek kwasów tłuszczowych Omega-3 wspiera regenerację podczas procesów zapalnych, zapobiega wychudzeniu i wpływa na zdrowy wygląd okrywy włosowej. Dodatek inuliny, będącej źródłem oligosacharydów, stanowi pożywkę dla korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego.

Rozwój prawidłowej mikroflory sprzyja stabilizacji pracy jelita grubego oraz poprawie konsystencji kału. Ponadto ogranicza wydalanie niestrawionych składników pokarmowych i wytwarzanie nieprzyjemnych gazów.

Odżywka zawiera również ekstrakt z drożdży *Saccharomyces cerevisiae* standaryzowany na zawartość beta-glukanu (1,3/1,6) – 70%. Beta-glukan posiada wyjątkowe właściwości pobudzające odporność organizmu, co jest wyjątkowo istotne podczas rekonwalescencji i ogólnego osłabienia organizmu.

Warto wiedzieć:

Proamyl dostarcza nie tylko składników pokarmowych, co ważne dostarcza hydrolizowanego białka, które nie wywołuje reakcji alergicznych i może być stosowane u zwierząt z alergią pokarmową.

Białko drobiowe, które jest składnikiem produktu – zostało poddane procesowi hydrolizy, w wyniku którego następuje rozerwanie długiego łańcucha polipeptydowego na krótsze łańcuchy lub poszczególne aminokwasy. Hydrolizowane białko ma szczególne cechy dietetyczne – dzięki rozbiciu łańcuchów polipeptydowych układ immunologiczny zwierzęcia przestaje identyfikować pochodzenie białka. Białko w tej postaci nie powoduje uwalniania histaminy, ze względu na to, że jego cząsteczki są mniejsze niż 10 000 daltonów i nie mogą doprowadzić do połączenia immunoglobulin IgE. Cecha ta powoduje, że hydrolizowane białko jest bardzo często wykorzystywane w produkcji karm hipoalergicznych. Pozwala to wykorzystywać hydrolizowane białko jako składnik karm stosowanych w dietach eliminacyjnych podczas występowania alergii pokarmowych – np. u psa uczulonego na drób nie powinna wystąpić reakcja alergiczna na hydrolizowane białko drobiowe.

SKŁAD: wysokostrawny hydrolizat białka drobiowego, inulina, ekstrakt z drożdży piekarniczych *Saccharomyces cerevisiae**, mikrokapsułowany olej rybi

* - standaryzowany na zawartości β -glukanu 1,3/1,6 – 70%

DODATKI SENSORYCZNE: ekstrakt z trzustki (*Sus scrofa*)*

* - standaryzowany na zawartość lipazy (nie mniej niż 55 000 000 IU/kg), amylazy (nie mniej niż 45 000 000 IU/kg), proteazy (nie mniej niż 3 500 000 IU/kg)

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 86,1%, włókno surowe 1,4%, tłuszcz surowy 0,5%, popiół surowy 5,8%

STOSOWANIE: Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posiłku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

- do 10 kg – 1 płaska miarka
- 10-25 kg – 2 płaskie miarki
- powyżej 25 kg – 3 płaskie miarki

Zaleca się uwzględnianie porcji produktu w całkowitej ilości karmy dziennej. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na suchej karmie, należy lekko ją zwilżyć, tak by proszek przylegał do pokarmu i został spożyty przez zwierzę.